

PATVIRTINTA

Gargždų lopšelio-darželio „Gintarėlis“
direktoriaus 2026 m. rugsėjo 2 d.
įsakymu Nr. V1-42

GARGŽDŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „GINTARĖLIS“ PIRMOSIOS PAGALBOS RINKINIŲ PRIEŽIŪROS IR EPINEFRINO APSKAITOS TVARKOS APRAŠAS

I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Šis tvarkos aprašas nustato Gargždų lopšelio-darželio „Gintarėlis“ (toliau – Įstaiga) pirmosios pagalbos rinkinių sudarymo, laikymo, priežiūros ir patikros, vaistinio preparato epinefrino įsigijimo, laikymo, kokybės kontrolės, apskaitos ir netinkamo naudoti epinefrino tvarkymo organizavimą.
2. Pirmosios pagalbos rinkiniai skirti pirmajai pagalbai Įstaigoje esantiems vaikams, darbuotojams ir kitiems asmenims suteikti.
3. Įstaigos pirmosios pagalbos rinkinių sudėtis turi atitikti galiojančio Švietimo teikėjų, vykdančių ikimokyklinio, priešmokyklinio ir bendrojo ugdymo programas, pirmosios pagalbos rinkinio aprašo reikalavimus.

II SKYRIUS RINKINIŲ SUDĖTIS, VIETA IR ŽENKLINIMAS

4. Įstaigos visuomenės sveikatos specialisto kabinete esančiame pirmosios pagalbos rinkinyje yra vienas 150 mikrogramų injekciniu tirpalu užpildytas epinefrino švirkštiklis, skirtas vaikams, sveriantiems iki 30 kg., ir vienas 300 mikrogramų injekciniu tirpalu užpildytas epinefrino švirkštiklis, skirtas vaikams ir suaugusiems, sveriantiems virš 30 kg.
5. Įstaigos padalinio, adresu Turgaus g. 19, Gargždai (toliau – Padalinys), priešmokyklinio ugdymo grupės „Obuoliukai“ pirmosios pagalbos rinkinyje yra vienas 150 mikrogramų injekciniu tirpalu užpildytas epinefrino švirkštiklis, skirtas vaikams, sveriantiems iki 30 kg.
6. Pirmosios pagalbos rinkinys visuomenės sveikatos specialisto kabinete yra laikomas aiškiai pažymėtoje ir darbuotojams lengvai prieinamoje vietoje. Rinkinys, kuriame yra epinefrino, laikomas vaikams nepasiekiamoje, tačiau pirmąją pagalbą teikti apmokytiems asmenims skubiai prieinamoje vietoje.
7. Rinkinyje negali būti pasibaigusio tinkamumo vartoti laiko medicinos priemonių ar netinkamo naudoti epinefrino.
8. Jei Įstaigoje yra ugdomas ugdytinis, kurio profilaktinio sveikatos patikrinimo pažymoje pažymėta, kad jam gali prireikti pagalbos dėl anafilaksinės reakcijos ir kaip pirmosios pagalbos priemonę paskirta nuolatos turėti su savimi epinefrino švirkštiklį (adrenalino autoinjektorius), gydytojų rekomendacijų įgyvendinimas turi būti užtikrinamas Visuomenės sveikatos priežiūros organizavimo mokykloje tvarkos aprašo nustatyta tvarka ir atsižvelgiant į rekomendacijas. Individualaus naudojimo, konkrečiam mokiniui skirtas sveikatos priežiūros priemonės (pvz., epinefrino švirkštiklį (adrenalino autoinjektorius) parūpina jo tėvai (globėjai, rūpintojai).

III SKYRIUS ATSAKINGŲ ASMENŲ FUNKCIJOS

9. Įstaigos direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams organizuoja epinefrino įsigijimą iš visuomenės vaistinės ir atsako už visų Įstaigos pirmosios pagalbos rinkinių atnaujinimą ir papildymą pagal nustatytą sudėtį ir kiekius.

10. Visuomenės sveikatos specialistas užtikrina, kad epinefrinas, laikomas pagrindiniame Įstaigos pastate ir Padalinyje, būtų galiojančio tinkamumo vartoti laiko, jo tirpalas būtų skaidrus ir bespalvis, o preparatas būtų laikomas kartu su pakuotės lapeliu ant pakuotės nurodytomis laikymo sąlygomis.

11. Visuomenės sveikatos specialistas vykdo viso Įstaigos turimo epinefrino apskaitą ir užtikrina, kad apskaitos duomenys būtų pildomi apie jo gavimą, panaudojimą ir išėmimą iš rinkinio kaip farmacinę atlieką.

12. Visuomenės sveikatos specialistas išima iš visų Įstaigos ir Padalinio rinkinių, kuriuose yra laikomas epinefrinas, nekokybišką ar pasibaigusio tinkamumo vartoti laiko epinefriną, o direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams organizuoja jo perdavimą tvarkyti kaip farmacinę atlieką teisės aktų nustatyta tvarka.

IV SKYRIUS PATIKRA IR APSKAITA

13. Pirmosios pagalbos rinkinių sudėtis ir priemonių tinkamumo naudoti laikas tikrinami ne rečiau kaip kartą per mėnesį, taip pat po kiekvieno rinkinio panaudojimo. Patikros rezultatai registruojami Pirmosios pagalbos rinkinių patikros žurnale (1 priedas).

14. Epinefrino tirpalo kokybė tikrinama periodiškai taip, kaip nurodyta konkretaus vaistinio preparato pakuotės lapelyje. Taip pat nuolat sekamas tinkamumo vartoti laikas.

15. Jeigu epinefrino tirpalas pakeitė spalvą, susidrumstė, jame atsirado dalelių arba pasibaigė tinkamumo vartoti laikas, švirkštiklis nedelsiant išimamas iš pirmosios pagalbos rinkinio ir nenaudojamas.

16. Epinefrino apskaitos žurnale (2 priedas) registruojami preparato gavimo duomenys, panaudojimo data ir priežastis, asmuo, kuriam jis panaudotas, taip pat duomenys apie netinkamų naudoti švirkštiklių išėmimą ir perdavimą šalinti. Apskaitos žurnalas gali būti pildomas popierine arba elektronine forma.

V SKYRIUS EPINEFRINO PANAUDOJIMAS IR VEIKSMAI PO JO

17. Įtarus anafilaksiją, pirmąją pagalbą nedelsdamas teikia visuomenės sveikatos specialistas, o jam nesant, pirmąją pagalbą teikti apmokyti darbuotojai, vadovaudamiesi savo kompetencija, konkretaus epinefrino švirkštiklio pakuotės lapeliu ir pirmosios pagalbos mokymuose įgytomis žiniomis.

18. Panaudojus epinefriną nedelsiant kviečiama skubioji medicinos pagalba bendruoju pagalbos numeriu 112 ir informuojami vaiko teisėti atstovai pagal Įstaigoje nustatytą tvarką.

19. Epinefrino panaudojimo atvejis nedelsiant užregistruojamas Epinefrino apskaitos žurnale ir įforminamas Pirmosios pagalbos suteikimo ir epinefrino panaudojimo aktu (3 priedas).

20. Apie įtariamą nepageidaujamą reakciją pranešama vaistinio preparato pakuotės lapelyje nurodyta tvarka.

VI SKYRIUS BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

21. Už šio Aprašo laikymąsi pagal kompetenciją atsako Įstaigos vadovo paskirti atsakingi asmenys ir pirmąją pagalbą teikiantys darbuotojai.

22. Darbuotojai turi žinoti pirmosios pagalbos rinkinių buvimo vietas ir kuris rinkinys yra su epinefrinu.

23. Šis Aprašas taikomas kartu su Įstaigoje galiojančia darbuotojų veiksmų vaikui susirgus ar patyrus traumą, teisėtų atstovų informavimo ir pirmosios pagalbos organizavimo tvarka.

[illegible]

A. GAVIMAS IR LIKUTIS

[illegible][illegible]

Gargždų lopšelio-darželio „Gintarėlis“
Pirmosios pagalbos rinkinių priežiūros
ir epinefrino apskaitos
tvarkos aprašo 3 priedas

PIRMOSIOS PAGALBOS SUTEIKIMO IR EPINEFRINO PANAUDOJIMO AKTAS

202__ m. _____ d. Nr. _____ Gargždai

1. Įvykio data, laikas ir vieta:

2. Asmuo, kuriam suteikta pagalba (vardas, pavardė): _____

3. Pastebėti simptomai / aplinkybės:

4. Panaudotas epinefrino švirkštiklis (pavadinimas, stiprumas):

5. Serijos Nr. _____ Tinka iki _____

6. Epinefrino panaudojimo laikas: _____ val. _____ min.

7. Skubiosios pagalbos numeriu 112 paskambinta: _____ val. _____ min.

8. Vaiko teisėti atstovai informuoti: _____ val. _____ min.

9. Pirmąją pagalbą suteikęs asmuo (vardas, pavardė, pareigos):

10. Trumpas suteiktos pagalbos ir tolesnių veiksmų aprašymas:

11. Pastabos:

Pagalbą suteikęs asmuo

(parašas)

(vardas, pavardė)

Gargždų lopšelio-darželio „Gintarėlis“
Pirmosios pagalbos rinkinių priežiūros
ir epinefrino apskaitos
tvarkos aprašo 4 priedas

ANAFILAKSIJOS ATPAŽINIMO IR VEIKSMŲ ATMINTINĖ

ANAFILAKSIJA – sunki, greitai progresuojanti alerginė reakcija. Įtarus anafilaksiją, veikite nedelsiant.

1. ATPAŽINKITE. Galimi požymiai: staigus kvėpavimo pasunkėjimas, švokštimas, liežuvio ar gerklės tinimas, užkimimas, išplitusi dilgėlinė ar paraudimas, silpnumas, sąmonės sutrikimas, kolapsas. Simptomai gali būti įvairūs ir ne visi pasireiškia vienu metu.

2. NAUDOKITE EPINEFRINĄ. Jei įtariama anafilaksija, pirmąją pagalbą teikti apmokytas darbuotojas panaudoja epinefrino švirkštiklį pagal konkretaus preparato pakuotės lapelyje pateiktą naudojimo instrukciją.

3. KVIESKITE 112. Nedelsiant skambinkite bendruoju pagalbos numeriu 112, aiškiai pasakykite, kad įtariama anafilaksija ir kad epinefrinas panaudotas.

4. NEPALIKITE ASMENS VIENO. Stebėkite kvėpavimą ir sąmonę, vykdykite 112 dispečerio nurodymus. Prireikus pradėkite gaivinimą pagal pirmosios pagalbos mokymuose įgytas žinias.

5. INFORMUOKITE. Informuokite vaiko teisėtus atstovus pagal Įstaigoje nustatytą tvarką.

6. UŽFIKSUOKITE. Po įvykio užpildykite epinefrino apskaitos įrašą ir Pirmosios pagalbos suteikimo ir epinefrino panaudojimo aktą.

SVARBU: epinefrino švirkštiklių konstrukcija ir naudojimo trukmė gali skirtis, todėl nenaudokite vienos konkrečios spalvų ar sekundžių taisyklės visiems preparatams – visada vadovaukitės turimo preparato pakuotės lapeliu.